

「手術需要全身麻醉，利用自身的筋膜吊高眼瞼，近年大多會使用一些人造的植入物來吊高眼瞼肌肉。這個手術並不能完全恢復眼瞼活動能力，但這些物料有一定彈性，眨眼時差不多可以完全覆蓋眼珠，但靈活度略遜。做完手術初期會有眼乾情況，故會建議小朋友使用人造淚水或潤眼啫喱紓緩眼乾情況，術後眼睛會漸漸自我調節分泌更多淚水，解決眼乾問題。」吳醫生說。

兒童術後即日可以正常看事物，毋須遮擋眼睛，但如果傷口流血，或需要遮擋眼睛一天。

兒童術後即日可以正常看事物，毋須遮擋眼睛，但如果傷口流血，或需要遮擋眼睛一天。

況，故會建議小朋友使用人造淚水或潤眼啫喱紓緩眼乾情況，術後眼睛會漸漸自我調節分泌更多淚水，解決眼乾問題。」吳醫生說。


兒童術後即日可以正常看事物，毋須遮擋眼睛，但如果傷口流血，或需要遮擋眼睛一天。

這位兒童左眼瞼下垂，程度輕微的眼瞼下垂，外觀上未必能看出來。（網上圖片）



▲家長如發現兒童有眼瞼下垂問題，應求診檢查清楚。
(資料圖片)

▼眼瞼下垂會遮擋視野，有機會影響兒童學習。
(資料圖片)



程度輕微的眼瞼下垂，外觀上未必能看出來。
(網上圖片)



五歲的Rachel去年底接受眼瞼下垂的修正手術。「女兒出生後不久，發現她的其中一隻眼比較細，半歲時見過眼科醫生，確定為眼瞼下垂。醫生說最好等到四歲時才做手術，之後我便每天幫她做遮眼訓練，避免出現懶惰眼或弱視。直至去年底醫生認為女兒的情況許可，便安排她做矯正手術。」Rachel媽媽說。

最近Rachel做視力檢查，確

定視力發展良好，平日上課或在家學習都與年長兩歲的哥哥一樣，視力沒有受到影響。

戴隱形眼鏡扯鬆眼瞼

後天的眼瞼下垂，包括成人患者或年長患者，主要是由於提眼肌退化造成。吳醫生說，後天的眼瞼下垂，其中一個常見原因是因為長時間佩戴隱形眼鏡，當佩戴或摘下時經常拉扯眼瞼而令肌肉鬆弛，久而久之令眼瞼下垂。



佩戴隱形眼鏡
出相應調整。



眼望到最高及最



▲長者的提眼肌退化，亦容易出現眼瞼下垂情況。（資料圖片）

►兒童患者一般會建議四歲後接受手術，之前可以用遮眼方式訓練眼瞼下垂的眼睛，避免弱視。
(資料圖片)



眼望到最高及最

低的活動幅度、水平視線向前望時可以見到多少黑色瞳仁，確定米黑色瞳仁，另一邊只見到七點五毫米，即是雙眼相差二點五毫米。由於他的提眼肌功能正常，醫生建議以縮短提眼肌的方法改善眼瞼下垂問題。馮先生同意並於去年底接受手術，他對術後效果感到非常滿意。

「未做手術前，因為大細眼的關係，我經常不自覺地想睜大點眼睛，甚至令一邊眉毛『戚起』，形成高

低眉，做完手術後，不但改善了大細眼問題，眼瞼亦回復對稱。

高低眉回復對稱

成人進行眼瞼下垂矯正手術所需的時間和兒童差不多，大約需時一至兩小時。病人一般會接受局部麻醉，手術會在病人清醒下進行，好處是可以讓醫生在手術過程中，即時知道效果及作

成人眼瞼下垂同樣可以通過手術矯正，但手術方式有所不同。「成人眼瞼下垂程度通常比兒童輕微，主要是因為經常拉扯眼瞼肌肉而導致鬆弛，但其功能是正常的。提瞼肌功能正常的病人，可

透過手術收緊或切除部分提瞼肌，情況就如窗簾的皺摺鬆了，就把它收緊，以加強眼瞼向上抬的功能。」吳醫生說。



成人進行眼瞼下垂矯正手術所需的時間和兒童差不多，大約需時一至兩小時。病人一般會接受局部麻醉，手術會在病人清醒下進行，好處是可以讓醫生在手術過程中，即時知道效果及作

佩戴隱形眼鏡人士長期拉扯上下眼皮，有機會扯鬆眼瞼引致下垂。至於捽眼會引致眼瞼下垂嗎？

吳彤醫生說，這種情況不常見。相比起戴隱形眼鏡時要把眼瞼垂直向上或下拉扯，捽眼的動作是橫向的，不容易拉鬆眼瞼。

吳彤醫生說，這種情況不常見。相比起戴隱形眼鏡時要把眼瞼垂直向上或下拉扯，捽眼的動作是橫向的，不容易拉鬆眼瞼。

吳彤醫生說，這種情況不常見。相比起戴隱形眼鏡時要把眼瞼垂直向上或下拉扯，捽眼的動作是橫向的，不容易拉鬆眼瞼。

吳彤醫生說，這種情況不常見。相比起戴隱形眼鏡時要把眼瞼垂直向上或下拉扯，捽眼的動作是橫向的，不容易拉鬆眼瞼。

吳彤醫生說，這種情況不常見。相比起戴隱形眼鏡時要把眼瞼垂直向上或下拉扯，捽眼的動作是橫向的，不容易拉鬆眼瞼。