

加上病人即使知道曾經有藥物過敏，亦往往不知道該如何處理。「如果懷疑或相信病人對某種藥物過敏，醫生在處方時會避免使用，但有時若該種藥物是最有效的，病人會因此終生無法使用此藥，而需要轉用效果次一等的藥物。又或一些懷疑對麻醉藥過敏的病人，可能會因此終生無法進行手術，連小型的脫牙手術也無法施行。」李德康醫生說。

而在藥物過敏範疇中，較多發現的是對麻醉藥及抗生素產生過敏反應，麻醉藥是手術的必需藥物，而抗生素亦在治療過程中廣泛被運用，如果病人真的因為過敏而無法接受此兩類藥物，將大大影響治療。

我們因病求診時，醫生都會問我們有沒有藥物過敏？大家都是隨口答一句「沒有」。但我們真的沒有任何藥物過敏嗎？

一向以為自己沒有藥物過敏的Angel，在手術期間就因藥物過敏幾乎喪命，此後不敢再做任何手術；另一位疑對藥物過敏的黃女士，亦無法採用該種藥物，致病情難以控制。

難道有藥物過敏的人士，就要終身避開該藥物，原本的病症也不治療，任由它蠶食健康嗎？

撰文：陳旭英 攝影：張文智 設計：陳承峰

▼曾經有懷疑藥物過敏學童，在學校注射疫苗後休克，送院急救。



▼其中一種非類固醇消炎藥



常見藥物敏感

- 抗生素
- 抗癌藥
- Cisplatin家族 (抗癌藥)
- 非類固醇類消炎藥

藥物過敏人士有機會在服藥後短時間內出現呼吸困難、休克等嚴重情況。

測試找出過敏元兇

「有時治療某些病症，只能用特定一種抗生素或藥物，如病人因懷疑過敏而一世不能使用，不但病情難控制，更白白浪費了大好藥物。所以我們引入美國和歐洲國家普遍使用的藥物過敏測試，以皮下注射方式為病人進行藥物測試，並由醫護人員緊密監察，從而為病人找出真正過敏的藥物。」李醫生解釋。

像Angel的個案，她手術前除了注射麻醉藥，亦注射了抗生素，因而出現致命性過敏反應，

藥物敏感 險奪命

藥 物有逾千萬種，如果我們沒用過該種藥物，如何知道自己有過敏？Angel就和很多人一樣，並不知道自己已有藥物過敏，亦不意識到藥物過敏的嚴重性，結果在今年七月遇上一場浩劫。

「我患有子宮肌瘤，由於位置難以切得清，於是要做全子宮切除手術。七月時我進入手術室注射了麻醉藥後便失去知覺，醒來後以為手術已經完成，但原來我已身在深切治療部，身上插了很多喉管，人也暈眩，很辛苦；醫生告訴我，剛才沒有為我進行手術，因為我突然出現危急狀況，要搶救……」Angel說。

麻醉科醫生向她解釋，當她注射了麻醉藥及抗生素，預備進行手術之際，突然出現氣管收



►李德康醫生指出，懷疑藥物過敏人士應找出真兇，一來為了安全，二來可避免錯怪藥物，令自己得不到最佳治療。

縮致無法呼吸，而且血壓急降，醫生馬上為她急救，注射腎上腺素、強心針等，而原定計劃進行的全子宮切除手術亦被迫取消。

兩種藥物 誰是真兇

到底為何會出現這種狀況，是對麻醉藥過敏嗎？麻醉科醫生

說，麻醉藥是其中一個可能性，但她同時注射了抗生素，亦有機會引致過敏反應。麻醉科醫生建議Angel到養和醫院過敏病科中心見李德康醫生，找出致敏元兇，否則這一生都無法進行手術，一直纏擾她的子宮肌瘤亦暫時無法根治。

養和過敏病科主任李德康醫生說，藥物過敏在香港很普遍，亦難以診斷，而且引發的後果可以十分嚴重，或可以致命。

到底她是對麻醉藥過敏，還是對抗生素過敏？她在今年九月的測試中，找到了答案。

「醫護人員將極少劑量的麻醉藥，透過皮下注射注入身體，結果我沒有出現任何反應。其後再進行抗生素測試時，很快我便出現呼吸困難、嘔吐、腹瀉及全身痕癢的過敏反應……原來，引致我過敏的不是麻醉藥，而是抗生素。」Angel說。

抽絲剝繭 真兇現形

她憶述麻醉科醫生所言，當天在注射了抗生素Augmentin後十五分鐘出現過敏反應，故相信是抗生素過敏機會較大。這次確認了她對麻醉藥沒有過敏，便可以計劃進行子宮切除手術，以及

脫牙手術，解決擾攘多時的牙患。

但她對Augmentin過敏，意味著她日後不能使用這種廣泛利用的藥物，或會影響治療。「Augmentin由兩種藥物組成，一種是Amoxicillin（盤尼西林的「兄弟」），另一種是Clavulanate。由於盤尼西林過敏測試的結果是陰性，即表示她對Clavulanate過敏。Angel日後有需要時可用盤尼西林，只是不可以用Clavulanate。」李醫生說。

這次解開疑團，相信Angel可以放心進行手術了！然而這次因藥物過敏幾乎喪命，令Angel留下「一朝被蛇咬，終生怕草繩」的陰影，擔心下一次手術所用的藥物會過

▼ 藥物過敏患者常見的是引發紅疹，圖為其中一名病人腹部出現一大片紅疹。



▼ 另一位藥物過敏患者，手部出現密密麻麻的紅疹。



治肺炎 出紅疹

另一位懷疑藥物過敏的是黃女士，她患有支氣管擴張多年，最近醫生為她處方消炎藥，卻引致過敏反應。

「我的病症屬長期病，經常咳嗽，而且有很多痰液。數月前咳得很辛苦，於是見呼吸系統專科陳醫生，經檢查後發現患肺炎，要注射抗生素治療。惟注射後三小時，我全身出了紅疹，由於擔心是藥物過敏，其後陳醫生轉用其他藥物，惟效果一般。為了確定我是否對抗生素過敏，陳醫生轉介我到養和過敏病科中心進行藥物過敏測試。」黃女士向記者說。

尋真相 免錯怪藥物

李醫生在了解過她的病歷後，先為她進行該種治療肺炎的抗生素過敏測試，結果是陰性的。李醫生說，一般藥物的過敏反應會在短時間內出現，黃女士在注射後數小時才出紅疹，故相信並非藥物過敏。黃女士可以根據這次結果，重新再用該種藥物治療肺炎。

至於黃女士為何會出紅疹，

▼ 藥物的過敏反應輕者是出紅疹，嚴重的氣管收縮，以及血壓急降、休克等。



解構抗生素 Augmentin

Augmentin是一種由盤尼西林製成的抗生素，它能消滅一般常見的細菌，亦廣泛應用於治療腸道細菌感染、兒童發燒、鼻竇炎、肺炎、支氣管炎、尿道炎及皮膚炎等病症，所以大多數人一生中都會曾使用。

它由Amoxicillin及Clavulanate potassium組成。Amoxicillin是盤尼西林的一種，能殺死體內的細菌。Clavulanate potassium與盤尼西林相似，可以殺死對盤尼西林有抗藥性的細菌，即是說，當Amoxicillin及Clavulanate potassium聯合使用，可以更廣泛地及有效地殺死引起疾病的細菌。



▲ 為病人進行注射，將極少劑量的藥物通過皮下注射進入身體，逐次增加，令身體慢慢適應。



▼ 護士會先在皮膚上劃上記號，然後才逐次注射。

► 懷疑藥物過敏可進行測試，將不同致敏原，注射入皮膚。

脫敏治療解決過敏

「病人可以進行脫敏治療，將極少量的致敏藥物進行皮下注射，讓病人適應，之後慢慢逐次加大份量，直至不再出現過敏反應為止。注射期間會在醫院由專業醫護人員監控，整個過程大約需時一星期。」李醫生解釋。

他說過往有不少接受化療的癌症病人因為藥物過敏，需要進行脫敏治療。「如果病人沒有其他藥物能代替，就應考慮進行脫敏治療；如病人有其他藥物可以替代，就不一定需要接受脫敏治療。」

李醫生指出：「懷疑藥物過敏人士應找出致敏源頭，除了為了安全外，更可避免錯怪藥物，令自己不能得到最有效的治療。」

▼ 如懷疑病人有盤尼西林藥物過敏，通常會利用此四種藥物進行測試，找出真兇。



敏，所以她計劃未來數月進行脫牙及子宮切除手術前，會先聯絡麻醉科醫生及主診醫生，索取所有藥物資料，先進行藥物過敏測試，確定沒有問題才進行手術。她亦呼籲其他有需要進行手術人士，不妨事先做藥物測試以策安全。