


跑馬地  
養和醫院  
香港跑馬地山村道2號中院4樓  
電話：(852) 2835 8698  
傳真：(852) 2892 7511  
surgerycentre@hksh-hospital.com  
www.hksh-hospital.com

辦公時間  
星期一至星期五：上午九時至下午五時  
星期六：上午九時至下午一時  
星期日及公眾假期休息  
敬請預約


# 痔瘡



查詢或預約，歡迎聯絡我們

痔瘡是由肛門的細小血管和軟組織形成。長期便秘、長期用力排便，都會引致肛門附近的血液循環受到阻礙，或令周圍的組織變弱，引起血管腫脹及軟組織突出，形成痔瘡。

痔瘡可分為內痔、外痔及混合痔三類。內痔位於痛楚分界線齒狀線以上，病者一般都不會感到痛楚。外痔位於齒狀線以下，並突出至肛門外，可以看到及摸到。當痔瘡發作時，病者會感到痛楚。如痔瘡範圍從齒狀線以上伸延至以下的，則稱為混合痔。



## 痔瘡所引起之問題

痔瘡的主要病徵多是排便時或排便後肛門出血。其他病徵包括大便帶血、排便時有軟組織垂出肛門外、肛門痕癢或疼痛、當痔瘡受擠壓及突出時，肛門會有疼痛不適的感覺。

痔瘡可按其嚴重性分為四期：

- 第一期：痔瘡在肛門內，並沒有突出，只產生一些病徵，如流血。
- 第二期：痔瘡突出至肛門外，但在排便後可自動復位。
- 第三期：痔瘡在病者排便後不能自動復位，需人手幫助將其復位。
- 第四期：痔瘡長期留於肛門外，病者無法將其復位。

## 治療痔瘡之方法

痔瘡的治療方法需按其嚴重程度而定。第一及第二期的痔瘡，一般採用藥物注射控制，或以橡筋結紮方法使痔瘡缺血收縮。但當痔瘡發展到第三或第四期的時候，則需以外科手術將之切除。

傳統開放式手術把脹大的痔瘡於肛門第三、第七及第十一點鐘的位置割除，但使病者留有外露的傷口，因此較為痛楚，需數星期方可康復。現今外科手術已可採用微創技術治療痔瘡。

## 微創手術治療痔瘡

環狀切除手術可治療內痔及體積較小的外痔。外科醫生會把「痔瘡儀器」放進肛門內，以環狀式切除內痔，及切斷附近黏膜供給痔瘡的血管。如屬外痔，則先將之推回肛門內，予以固定，再以「痔瘡儀器」作環狀式切除，及切斷血液供應。由於切除痔瘡的位置在齒狀線以上，故此手術後病者的痛楚是非常輕微。

## 微創手術的優點

環狀式切除手術與傳統手術所達致的治療效果無異。因環狀式切除手術的傷口是封閉的，故能大大減低痛楚及傷口受感染的機會，手術後更毋須特別護理。病者一般可在手術後第一天出院(視乎病人情況而定)，數天後便可恢復日常活動。

養和醫院承諾為病人提供最好的醫療服務。本中心的專科醫生全面顧及病人需要和安全，在使用微創手術治療痔瘡方面，均具備豐富經驗和超卓技術。