

診斷及介入放射部 Department of Diagnostic & Interventional Radiology

灌腸造影檢查



查詢或預約，歡迎聯絡我們

診斷及介入放射部

香港跑馬地山村道二號

養和醫院李樹培院一樓

電話：2835 8900

傳真：2892 7530

電郵：radiology@hksh-hospital.com

www.hksh-hospital.com

DR_3091/H/C-03-082016



養和醫院
Hong Kong Sanatorium & Hospital

診斷及介入放射部

Department of Diagnostic &
Interventional Radiology

甚麼是灌腸造影檢查？

是把造影劑由肛門引入大腸，從而產生腸臟的影像，用以檢查大腸的狀況。

一般的 X 光檢查不能照出大腸嗎？

一般的 X 光檢查只能顯示出大腸的輪廓，但灌腸造影檢查就能清楚地照出大腸的內壁。

什麼情形下需要做灌腸造影檢查？

灌腸造影檢查是按病人的病徵由醫生轉介而進行的。病徵通常是大便出血、大便習慣改變、腹部痛楚等。

為什麼在檢查前須吃少渣滓的食物及輕瀉？

- 用意是盡量減少食物渣滓留在腸道內，及清除在腸道內的糞便，以免影響檢查結果。
- 檢查前兩天須禁止吃高纖維的食物如蔬菜、生果、麥皮等。
- 檢查前一晚要服食輕瀉劑，及後切忌飲食。

檢查進行時會有痛楚嗎？

檢查時，醫生會用造影劑及空氣灌漲腸道，可能會引起腹部漲痛。輕微不適，如廁後便會減退。

檢查後有什麼須知？

在檢查後數天內，大便可能會呈現白色及可能會便秘，檢查後須飲大量開水，可吃任何食物。

什麼情況下不能做灌腸造影檢查？

- 懷孕
- 檢查前 7 天內曾抽取腸組織

除灌腸造影外，還有什麼檢查可幫助確定病因？

- 內視鏡
- 電腦掃描仿真大腸內視鏡